Количество (объем) закупаемых лекаственных средств и медицинских изделии в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг на 2022год ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №3"

Приложение №3 к протоколу №15 от 16.06.2022 г

вскрытие 07.06.2022

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Количество на 2022 год	Цена по приказу	Сумма	ТОО "ONTUSTIK MEDICAL" вр 09:32 03.06.2022		ТОО "Мелиор LTD" вр 08:54 06.05.2022		ТОО "SATKOR" вр 15:56 03.06.2022		ВСЕГО ИТОГО	
							Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена	Сумма	Цена	Сумма
		Изделия медицинского назначения												
1	Щелочная фосфотаза (Alkanine Phosphatase) - ALP №671	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности щелочной фосфатазы (ALP) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Щелочная фосфатаза в образце катализирует гидролиз RNPP для формирования P-нитрофенолата и фосфатной кислоты, что вызывает повышение значения абсорбции света при 405нм. Активность щелочного фосфата образца рассчитывается при измерении скорости повышения абсорбционной способности при 405нм. Компоненты: Реагент 1 - Магния ацетат 3.0 ммоль/л; Цинка сульфат 1.5 ммоль/л; ХЭДТА 3.0 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Реагент 2 - p-нитробензол фосфатная кислота 81.5 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Содержит нереактивный	уп	2	19272	38544,0	17520	35040					17520	35040
2	Общий холестерин (Total Cholesterol) - TC №587	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина (TC) в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Холестериновый эфир в образце под воздействием липопртеиназтеразы в реагенте селективно катализируется и гидролизуется в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате общий холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует холест4-ен-3-ен-3-кетон и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы периоксид водорода вступает в реакцию с гидроксибензойной кислотой и 4амино-антипирином с образованием H2O и хининиминового пигмента. При этом объем образующегося хининиминового	уп	2	46332	92664,0	46332	92664					46332	92664
3	Лактат дегидрогеназа(Lactate Dehydrogenase)-LDH №587	Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro активности лактата дегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Происходит активация и окисление молочной кислоты при использовании лактата дегидрогеназы собразованием пировиноградной кислоты и возврата NAD в NADH. Активность ЛДГ образца вычисляют при измерении повышения скорости абсорбции NADH при 340 нм . Реагент 1Лактат лития 62.5 ммоль/л 4;Хлорид калия 190.0 ммоль/л ;Трис буфер 100.0 ммоль/л ;Реагент 2 Трис буфер	уп	2	50292	100584,0	50292	100584					50292	100584
4	Гаммаглутамилтрансфераза (γ-Glutamyl Transferase)GGT №671	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности гаммаглутамилтрансфераза (GGT) в сыворотке и плазме крови человека на биохимичесском анализаторе Dirui CS-T240. Настоящий реагент включает растворимый субстрат Glucana, рекомендованный МФКХ. Глутамил из γ-ГТ каталитического субстрата перемещается в глицилглицин, в результате чего образуется глутамил глицилглицин и 5-амино-2-нитрофенил формат. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 100 ммоль/л; Натрия хлорид 5 ммоль/л; Глицилглицин 125 ммоль/л. Реагент 2- Трис Буфер 100 ммоль/л; L-γ- глутамил -3карбокси-4-нитроанилин 14.5 ммоль/л. Содержит нересакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60–120 секунд. Линейныйдиапазон настоящего реагента – 0–450 ед/л (7,5 мккат/л). Объем R1-200 мкл. Объем R2-50 мкл. Объем образца-25 мкл. Количество	уп	2	40 524,00	81048,0	40524	81048					40524	81048

5	Гликолизированный гемоглобин A1C(Glycohemoglobin A1C)- HbA1C № 75	условиях in vitro содержания гликогемоглобина (HbA1C)в крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 . Настоящий метод применяется для определения процентного содержания HbA1c в общем Hb непосредственно после реакции антиген-антитело. Общий Hb и HbA1c с латексом имеет аналогичную неспецифичную адсорбцию технологии твердой фазы, добавляя специфичность моноклонального антитела формы HbA1c к латексHbA1c-мышиному HbA1c моноклональному комплексу антител. Этот комплекс формирует агглютинацию в связи с антителами козы против мышиных иммуноглобулинов IgG, объем агглютинации изменяется в связи с поверхностью объема твердой фазы HbA1c .При измерении абсорбции и сравнения стандартной кривой процентного соотношения концентрации HbA1c, высчитывается процентное содержание HbA1c в образце от всего объема Hb : Длина основной волны660 нм . Реагкнты R1 : Латекс 0.10% . Глициновый буфер 15 ммоль/л . Реагент 2 :R2-A : Антитела козы против мышиных иммуноглобулинов IgG 0.08 мг/мл ; Глициновый буфер 60 ммоль/л ; R2-B : Мышиное антитело к HbA1c человека 0.05 мг/мл ; Моноклональное антитело ; Глициновый буфер 60 ммоль/л ; Гемолизат H2O ; Калибратор гликогемоглобина Эритроциты человека в наборе. Контроль уровень 1; 2 в наборе . Время проведения теста 5 минут . Объем R 1- 300 мкл . Объем R2 - 100 мкл . Объем образца 8 мкл . Количество тестов в упаковке не более 75. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 2-15% . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Фдакон имеет индивидуальный штрих код, который	уп	1	370986	370986,0	370986	370986					370986	370986
6	Триглицериды (Triglycerides) - TG №587	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации триглицеридов (TG) в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Триглицериды в образце катализируются липопротеин липазой (LPL) и гидролизуются в глицерин и свободную жирную кислоту, под воздействием глицеринкиназы (GK) и аденозин трифосфата (ATP) образуется глицерин, глицерин фосфорилируется в 3-глицерофосфат. Под действием глицерин фосфат оксидазы (GPO), он вступает в реакцию с кислородом, в результате чего образуется пероксид водорода и дигидроксиацетон фосфат. Под воздействием	уп	2	53988	107976,0	53988	107976					53988	107976
7	Амилаза (Amylase)- AMY №783	Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности α-амилаза (AMY) в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Данный реагент действует методу, рекомендованному Международной федерацией клинической химии (IFCC), этилен-pNP-G7 (E-pNP-G7) принимается в качестве субстрата для предотвращения разложения эктоэнзима. Компоненты: R1- Глюкозидаза > 4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. R2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50 ммоль./л.; Хлорид	уп	1	277596	277596,0	277596	277596					277596	277596
8	Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель 945-776	Измеряемые тесты: pH, pO2, pCO2, K, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 100; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней	уп	4	887 850,00	3551400,0		0	887850	3551400			887850	3551400
9	Кювета AE -30№44-110-3	Кювета AE -30№44-110-3	уп	1	50000	50000,0		0						
10	CHROMagar Orientation (1 уп..на- 5 литров) RT412	CHROMagar Orientation (1 уп..на- 5 литров)	уп	1	39800	39800,0		0						
11	Универсальная индикаторная бумага (pH 0-12) в 1 уп.- 100 шт. ПНД 50-975-84	Универсальная индикаторная бумага (pH 0-12) в 1 уп.- 100 шт.	уп	1	7000	7000,0		0						
12	Манноза в 1 фл.флакон - 250 гр. О189	Манноза в 1 фл.флакон - 250 гр.	кг	0,5	45690,15	22845,1		0						
13	Галактоза в 1 фл.флакон - 250 гр.	в 1 фл.флакон - 250 гр.	кг	0,5	44615,84	22307,9		0						
14	Трегалоза в 1 фл.флакон - 250 гр.	1 фл.флакон - 250 гр.	кг	0,5	44450,03	22225,0		0						
15	BD BACTECTM Peds PLUSTM Medium Среда с сорбентом для культивирования аэробов из образцов детской крови и других случаев образцов малога объема (ликвор,синовиальная, перитонеальная жидкость и т.п.) В 1 уп - 50 фл	Среда с сорбентом для культивирования аэробов из образцов детской крови и других случаев образцов малога объема (ликвор,синовиальная, перитонеальная жидкость и т.п.) В 1 уп - 50 фл Для исследования - крови на стерильность	уп	20	161028	3220560,0		0			161025	3220500	161025	3220500
16	Термосумка на 19 литров	Для транспортировки компонентов крови	шт	4	33000	132000,0		0						

	Итого					**8137536,0**		**1065894**		**3551400**		**3220500**		**7837794**
								1065894		**3551400**		**3220500**		

Руководитель ОПЦ №3 **Сыздыкова Г.Ж**

Глав.бухгалтер: **Кожамбекова Ж.К**